1

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя

Россельхознадзора

27 СЕН 2024

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата Айнил

(организация-разработчик ООО «Фид-Про»,117186, г. Москва, ул. Нагорная, 32, к. I, офис II)

Номер регистрационного удостоверения:
77-3-06.24-5130 N ПВР-3-06.24/03938

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Айнил (Ainil).

Международное непатентованное наименование: кетопрофен.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Айнил в 1 мл содержит в качестве действующего вещества кетопрофен - 100 мг, а в качестве вспомогательных веществ: бензиловый спирт, L-аргинин, моногидрат лимонной кислоты (в количестве, необходимом для коррекции pH 6,3 - 7,7) и воду для инъекций - до 1 мл.

3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 3 года со дня производства, после первого вскрытия флакона лекарственный препарат можно использовать в течение 28 суток. Запрещается применять Айнил по истечении срока годности.

4. Выпускают препарат расфасованным по 100 мл во флаконы из темного стекла, укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Флаконы упакованы в индивидуальные картонные пачки и снабжены инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5 °С до 25 °С.

6. Айнил следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства.

9. Кетопрофен относится к нестероидным противовоспалительным лекарственным средствам — производным пропионовой кислоты.

10. Кетопрофен, входящий в состав препарата, обладает выраженным противовоспалительным, анальгезирующим и жаропонижающим действием, подавляет агрегацию тромбоцитов, стабилизирует лизосомальные мембраны, вызывает угнетение активности нейтрофилов у больных артритом животных. Механизм действия кетопрофена основан на подавлении синтеза простагландинов в результате воздействия на циклооксигеназное и липооксигеназное звено метаболизма арахидоновой кислоты.

Кетопрофен быстро всасывается из места инъекции, поступает в кровь и большинство органов и тканей. Максимальная концентрация кетопрофена в плазме крови достигается через 30 - 40 минут. Выводится препарат из организма преимущественно с мочой.

Айнил по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего, сенсибилизирующего и эмбриотоксического действия, не кумулируется в организме.

III. Порядок применения

11. Айнил назначают крупному рогатому скоту, свиньям и спортивным лошадям в качестве противовоспалительного, анальгезирующего и жаропонижающего средства при лечении острых и хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, вывихи, отеки, тендовагиниты, травмы), болевого синдрома различной этиологии (травматическая и послеоперационная боль, колики) и гипертермии различной этиологии.

12. Противопоказанием к применению Айнил является индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата, язва желудка и 12-перстной кишки, геморрагический синдром, выраженная почечная недостаточность. С осторожностью применяют препарат животным в состоянии дегидратации, гиповолемии и гипотензии вследствие возможного токсического влияния кетопрофена на почки.

13. При работе с Айнилом следует соблюдать общепринятые меры личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. После работы с лекарственным препаратом следует вымыть руки с мылом. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми

оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Препарат разрешен к применению беременным и новорожденным животным. Особенностей применения препарата у лактирующих животных не выявлено. Применение препарата в период лактации возможно по назначению ветеринарного врача в случае, если польза превышает потенциальный риск.

15. Айнил применяют животным один раз в сутки в следующих дозах:

- крупному рогатому скоту внутривенно или внутримышечно - 3 мл на 100 кг массы животного (эквивалентно 3 мг кетопрофена на 1 кг массы животного) в течение 1-3 дней;
- спортивным лошадям внутривенно при лечении опорно-двигательного аппарата- 1 мл на 45 кг массы животного (эквивалентно 2,2 мг кетопрофена на 1 кг массы животного) в течение 3-5 дней; при симптоматическом лечении колик – однократно 1 мл на 45 кг массы животного;
- свиньям внутримышечно - 3 мл на 100 кг массы животного (эквивалентно 3 мг кетопрофена на 1 кг массы животного) в течение 1-3 дней.

Продолжительность курса лечения зависит от состояния животного и определяется лечащим врачом.

16. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. У некоторых животных после применения препарата может возникать раздражение слизистой желудка и рвота. Указанные симптомы исчезают самопроизвольно и обычно не требует дополнительного применения лекарственных средств. В случае проявления аллергических реакций у чувствительного к компонентам препарата животного его применение прекращают и назначают антигистаминное и симптоматическое лечение.

Пустая упаковка из-под препарата подлежит утилизации с бытовыми отходами.

17. При передозировке препарата у животного может наблюдаться воспалительная реакция в месте инъекции, рвота (очень редко - кровяная рвота), фекалии черного цвета, угнетение дыхания, судороги.

18. Не следует применять Айнил одновременно с другими нестероидными противовоспалительными средствами, глюкокортикоидами, диуретиками и антикоагулянтами и смешивать в одном шприце с другими лекарственными средствами.

19. Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

20. При пропуске одной или нескольких доз препарата курс применения необходимо возобновить в предусмотренном режиме дозирования.

21. Убой крупного рогатого скота на мясо разрешается не ранее, чем через 5 дней, свиней - через 4 дня после последнего применения Айнила. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм пушным зверям. Молоко дойных животных во время и после использования Айнила разрешается использовать без ограничений.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.	ООО «АлексАнн» Адрес: 141705, Московская обл., г. Долгопрудный, Виноградная ул., 13.
Наименование, адрес организации, уполномоченной владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.	ООО «Фид-Про», 117186, г. Москва, ул. Нагорная, 32, к. I, офис II.

Представитель Конькова В.К.